



PHASE	INGREDIENT	INCI	%	FONCTION
I	Eau	Aqua	Qsp	
	Erylite®	Erythritol	3,0	Hydratant
	Sodium Gluconate	Sodium Gluconate	0,2	Chélatant
	Plantacare® 818 UP	Coco-Glucoside	5,0	Tensioactif doux
	XG FNPC	Xanthan Gum	0,2	Gélifiant Stabilisant
II	Cosmedia® SP	Sodium Polyacrylate	1,2	Polymère Emulsionnant
III	Eumulgin® BA 25	Beheneth-25	1,0	Emulsionnant H/E
	Emulgade® Sucro plus	Sucrose Polystearate & Cetyl Palmitate	4,0	Emulsionnant H/E
	Cegesoft® VP	Olus oil & Hydrogenated Vegetable Oil & Candelilla Cera	2,0	Beurre Végétal
	Cetiol® CC/MB	Dicaprylyl Carbonate & Tocopherol	4,0	Emollient
	Cutina® HVG	Hydrogenated Vegetable Glycerides	2,0	Facteur de consistance
	Cetiol® C5	Coco-Caprylate & Tocopherol	2,0	Emollient
	Myritol® 331	Coco-Glycerides	4,0	Emollient
	Cetiol® PGL	Hexyldecanol & Hexyldecyl Laurate	3,0	Emollient
	Lanette® O OR	Cetearyl Alcohol	1,0	Facteur de consistance
IV	Conservateur	Preservative	Qs	Conservateur
	Parfum	Parfum	0,2	Parfum
	Vitacel® CS 250 G	Cellulose	1,5	Particules Exfoliantes

MODE OPERATOIRE

- Ajouter un à un les éléments de la phase I dans l'eau, sous agitation.
- Faire chauffer les phases I et III à 80°C.
- Disperser la phase II dans I et laisser gonfler sous agitation pendant 20 minutes.
- Lorsque les deux phases sont homogènes, réaliser l'émulsion en dispersant la phase III dans le mélange I + II sous agitation élevée.
- Maintenir cette agitation pendant 10 minutes.
- Laisser refroidir sous agitation modérée à l'aide d'un bain d'eau froide.
- L'émulsion devient homogène et brillante autour de 45°C.
- Vers 30-35°C, ajouter les ingrédients de la phase IV un par un sous agitation.

CARACTERISTIQUES

pH : 6,3 – 6,5

Viscosité (Brookfield, RVT, spindle 6, speed 10) : 24 000 – 28 000 mPa.s